

## COVID-19: Prävention und Umgang in Primärversorgungspraxen

### Ärztlicher Fragebogen (strukturierte Symptomerfassung)

PatientIn: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr. für Rückruf: \_\_\_\_\_ Symptombeginn am: \_\_\_\_\_

COVID-19-Testung veranlasst (j/n): \_\_\_\_\_ Datum/Uhrzeit: \_\_\_\_\_


#### Symptomatik

|  | ja | nein | Schweregrad<br>L (leicht), M (mittel), S (schwer) | Seit wann? |
|--|----|------|---|------------|
| Plötzlicher Beginn   |    |      |   |            |
| <b>Luftnot/Kurzatmigkeit</b><br>... in Ruhe                                |    |      |   |            |
| ... bei Belastung  |    |      |   |            |
| Fieber   |    |      | °C  |            |
| <b>Beklemmungsgefühl</b>   |    |      |   |            |
| <b>Husten</b>  |    |      |   |            |
| <b>Geruchs-/Geschmacksstörung</b> (Anosmie)                                |    |      |   |            |
| Gliederschmerzen   |    |      |   |            |
| Abgeschlagenheit   |    |      |   |            |
| Halsschmerzen/-kratzen   |    |      |   |            |
| Schnupfen/Niesen   |    |      |   |            |
| Kopfschmerzen  |    |      |   |            |
| Durchfall/Bauchschmerz/Übelkeit  |    |      |   |            |
| Anderes (z. B. Erbrechen, ausgeprägte Schluckbeschwerden, Ausschlag etc.): |    |      |   |            |

|  |  |  |          |
|--|--|--|----------|
| Kontakt mit einem Corona-Patienten<br>(bestätigt/Verdacht)?/Reise in Risikogebiet? |  |  | Wer?/Wo? |
| Haben Sie chronische Erkrankungen?   |  |  | Welche?  |
| Nehmen Sie regelmäßig Medikamente?   |  |  | Welche?  |

Angehöriger: \_\_\_\_\_ Maßnahme: \_\_\_\_\_

## TRIAGEPFAD am Telefon



[www.kl.ac.at/coronavirus/telefontriage-und-einstufung](http://www.kl.ac.at/coronavirus/telefontriage-und-einstufung)

## VERDACHTSFALL ungeplant in der Ordination

### Schutzkleidung

- **Maske**  
medizinisches Personal:  
FFP2/3, zumindest aber chirurgische Maske  
Patient: chirurgische Maske
- **Handschuhe**
- **Körperschutz**  
Einmalschürze oder Mantel

### Milde Symptomatik:

In der Anmeldung identifizieren und in Heimquarantäne schicken (Testung, Koordination 1450)


### Kranke mit akutem Behandlungsbedarf

#### Isolation und Untersuchung mit entsprechender Schutzkleidung:

- möglichst entfernt vom Wartebereich
- Raum möglichst nicht betreten (Kommunikation via Telefon)
- Raum ohne Teppichboden und Polstermöbel
- nahe einem getrennten WC
- Glas Wasser zur Verfügung
- Tür zu
- Klimaanlage aus
- Fenster auf
- Müllentsorgung als medizinischer Abfall
- Desinfektion aller Oberflächen und des wiederverwendbaren Equipments (mit Schutzkleidung!), wenn Patient weg ist

[www.kl.ac.at/coronavirus/verdachtsfall-in-der-ordination](http://www.kl.ac.at/coronavirus/verdachtsfall-in-der-ordination)

## PATIENT AM TELEFON



## SELBSTISOLATION Heimquarantäne


**Kontakt 1450 -  
Meldung der  
Selbstisolation**

**Bei Verschlechterung  
der Symptome/fehlender  
Besserung > 7 Tage:**  
Kontakt mit dem Hausarzt  
oder 1450

**Bei akuter, kritischer  
Verschlechterung/Notfall: 144**  
COVID-Verdacht melden!


**Doppelter Müllsack,**  
72 h Trennung vom restlichen  
Hausmüll vor Entsorgung

**Getrennte Badezimmer,**  
sonst regelmäßige Reinigung;  
**getrennte Handtücher** oder  
**Einmalhandtücher** möglich



## COVID-19 POSITIV

Wenn aus ärztlicher Sicht die Spitalseinweisung indiziert ist: Entscheidungskriterien über Betreuungsort für zu Hause lebende Patienten im Spannungsfeld Patientenautonomie/Epidemie Gesetz/Quarantäne



[www.kl.ac.at/coronavirus/palliativbetreuung](http://www.kl.ac.at/coronavirus/palliativbetreuung)